


É muito importante diferenciar coleções líquidas compostas apenas por fluido exsudativo daquelas que possuem componentes sólido provenientes do processo de necrose.



```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Coleções peripancreáticas

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"819":"0","820":"0","821":"0","822":"0","823":"1"},"ra98euef":{"166": {"ai0099":"823","e9878":
```

Sabe-se que as coleções fluidas pancreáticas (CFP) surgem como evento adverso das pancreatites agudas, crônicas, traumas ou cirurgias pancreáticas, sendo de extrema importância seu correto diagnóstico e manejo, devido à semelhança radiológica com as doenças neoplásicas.

De acordo com a classificação revisada de Atlanta de 2012, as coleções pancreáticas são divididas em 4 subtipos.

(Vire o cel na horizontal para ver a tabela)