

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



ENDOSCOPIA E COVID 19

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"1168":"0","1169":"0","1170":"0","1171":"1","1172":"0"},"ra98euef":{"237":{"ai0099":"1171","e9878":"
```

Comentários:

A: Tendo em vista que a SOBED considera a endoscopia digestiva como de alto risco para geração de aerossóis, a recomendações de EPIs se estendem a todos os profissionais envolvidos com o ato do exame endoscópico (anestesiologistas, técnicos e auxiliares de enfermagem)¹.

B: O uso do face shield ou máscara cirúrgica sobre a máscara N95 tem como objetivo reduzir a contaminação da sua superfície. Deve-se lembrar de lavar o face shield e descartar a máscara cirúrgica após cada procedimento. Outra importante alternativa é deixar a N95 secando em ar atmosférico por 3 a 4 dias pois após esse período o vírus não terá sobrevivido².

C: Quando for necessário realizar um exame num paciente de alto risco ou positivo para COVID 19 deve-se sempre que possível realizá-lo em uma sala com pressão negativa (preferencialmente ao final do turno) exceto nos pacientes em UTI devendo sempre ser realizados no próprio leito³.

D: Segundo a SOBED apesar da maioria dos exames eletivos estarem suspensos, existem alguns casos de alta prioridade como erradicação de varizes esofágicas, programas de dilatação endoscópica, disfagia e obtenção de via alimentar, estadiamento de lesões neoplásicas e tratamento de complicações pós-operatórias^{1,6}. Em sua quarta atualização publicada em 20/04 a SOBED ainda pondera algumas indicações como dispepsia com sinais de alarme, DRGE complicada, investigação de suspeita de neoplasia de cólon, tratamento de lesões neoplásicas, avaliação pré-operatória e enteroscopia nos casos de

hemorragia⁶.

Segundo editorial escrito por Thierry Ponchon, a escolha dos procedimentos elegíveis nesse momento é uma equação complexa e deve-se levar em consideração as quantidades de EPIs disponíveis (o fator chave mais importante); ocupação das UTIs; potencial período de tempo em que o procedimento seria adiado (podemos prever pelo menos 2 meses de atraso); e o risco potencial de perda da chance em caso específico (diagnóstico de lesão precoce ainda endoscopicamente ressecável por exemplo). Este sugere que cada instituição ou cada região definam um algoritmo específico⁴.

E: No momento não são recomendadas alterações no reprocessamento dos endoscópios. A equipe de reprocessamento deve utilizar EPIs como luvas, gorro, avental, face shield e máscara cirúrgica. Sabe-se que contaminação mais significativa ocorre durante a pré-limpeza do endoscópio e na sala de procedimentos devido a respingos do botão ar/água. Embora não haja dados para justificar o uso de máscaras N95 na sala de reprocessamento, seu uso deve ser considerado, se disponível⁵.

Referências

1. Recomendações SOBED para Endoscopia Segura durante a pandemia por Coronavírus. Disponível em: <https://www.sobed.org.br/sobed-comunica/noticias/single/nid/atualizacao-003-das-recomendacoes-sobed-para-endoscopia-segura-durante-a-pandemia-por-coronavirus/>

2. Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators in Healthcare Settings. Disponível em: <https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html>
 3. Gralnek IM, Hassan C, Beilenhoff U, et al. ESGE and ESGENA Position Statement on gastrointestinal endoscopy and the COVID-19 pandemic. Endoscopy. 2020 Apr 17. doi: 10.1055/a-1155-6229. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 32303090.
 4. Ponchon T, Chaussade S. COVID-19: How to select patients for endoscopy and how to reschedule the procedures?. Endoscopy International Open 2020; 08(05): 699 - 700. doi:10.1055/a-1154-8768
 5. Management of endoscopes, endoscope reprocessing, and storage areas during the COVID-19 Pandemic. Disponível em https://www.asge.org/docs/default-source/default-document-library/gi-society-management-of-endoscope-fleet.pdf?sfvrsn=e488e52_2
 6. Recomendações SOBED para Endoscopia Segura durante a pandemia por Coronavírus. Documento # 004/2020 – 20/04/2020. Disponível em https://www.sobed.org.br/fileadmin/user_upload/sobed/2020/04/21/ENDOSCOPIA_SEGURA_SOBED_004_20_04_2020_final.pdf}}};
- /* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "ENDOSCOPIA E COVID 19"; var quizId = 222; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
- var wpvq_hideRightWrong = false;
- var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
- var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
- var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
- var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
- var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_10905&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/ _trashed/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1, e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;



var wpvq_redirection_page = "";