

Paciente de 31 anos encaminhado ao cirurgião para “gastrectomia por GIST gástrico”. Paciente nega qualquer sintoma no momento, tendo realizado endoscopia por queixas dispépticas há cerca de 4 meses. Traz o exame de endoscopia (fotos de interesse abaixo), não tendo sido realizadas biópsias.



```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>

QUIZ! Achado em antro gástrico. Você acerta esta aqui? - julho 2018

Por Guilherme Sauniti - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>



Pancreas ectópico

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

0%

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"849":"0","850":"1","851":"1","852":"0","854":"1","855":"0","856":"0","857":"0","858":"0","859":"0","860":"1","861":"0"},"ra98euef":{"172":{"ai0099":"851","e9878":"
```

Com este caso, ressalta-se a necessidade de um exame bem realizado, e com boa documentação fotográfica, com todos os recursos possíveis (magnificação, zoom, cromoscopia digital). Neste caso, apesar de não ser identificada pregas em ponte, ou mobilidade da lesão, as fotos demonstram lesão circunscrita, umbilicada e recoberta com mucosa normal, sugestiva de lesão subepitelial."},"173":{"ai0099":"854","e9878":"

O pâncreas ectópico (ou heterotópico) é definido como presença de tecido pancreático fora de sua localização normal, e que não possui ligação vascular ou anatômica com o pâncreas normal. Em geral, aceita-se que sua origem está relacionada a problemas de rotação dos brotos ventrais e dorsais, deixando ilhas de tecido fora do pâncreas normal. Sua prevalência é estimada entre 0,6 % a 13%, sendo o sítio predominante o estômago (25 a 38%), seguido pelo duodeno e jejuno proximal.

No estômago, o local mais comum é o antro, e classicamente, se apresenta como uma lesão subepitelial circunscrita, arredondada, recoberta com mucosa normal, com uma umbilicação central. Apenas 50% dos casos possuem a apresentação clássica, sendo comum haver dificuldade de diagnóstico diferencial com outras lesões submucosas, em especial GIST (lesão submucosa mais comum no estômago).

O diagnóstico definitivo só pode ser realizado com avaliação do tecido por anatomopatológico, o que em geral não é possível, já que a lesão é recoberta por mucosa normal. Em geral, a associação de tomografia

computadorizada associada a ultrassonografia endoscópica pode ajudar no diagnóstico diferencial."},"174":{"ai0099":"860","e9878":

O pâncreas ectópico gástrico em geral é assintomático, encontrado durante exames endoscópicos ou de imagem, ou ainda em cirurgias.

Por ser mais comum no antro gástrico, pode evoluir com sintomas de obstrução do piloro, a depender do seu tamanho (em geral maior que 2 centímetros). Por ter tecido pancreático, qualquer complicação pode ocorrer, como no pâncreas normal (pancreatite,pseudo cisto ou câncer), porém, tais complicações são raras.

O tratamento não possui consenso, devido a raridade das complicações, porém está indicado nos casos de obstrução intestinal (em geral, o pâncreas ectópico e um achado anatomopatológico destas cirurgias) e nos raros casos de complicação como abscesso e câncer (poucos casos descritos na literatura).

Bibliografia :

[Liu YM, Shen HP, Li X, Gong JP. Heterotopic pancreas: a clinical analysis of nine patients and review of literature. Am Surg. 2012 Mar;78\(3\):E141-3.](#)

[Trifan A, Târcoveanu E, Danciu M, Hu\u0163ana\u015fu C, Cojocariu C, Stanciu C. Gastric heterotopic pancreas: an unusual case and review of the literature. J Gastrointestin Liver Dis. 2012 Jun;21\(2\):209-12](#)

"}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-  
results var quizName = "Pancreas ectópico"; var quizId = 171; var  
totalCountQuestions = 3; var askEmail = false; var askNickname =  
false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false;  
var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var  
wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content =  
'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para
```

QUIZ! Achado em antro gástrico. Você acerta esta aqui? - julho 2018

Por Guilherme Sauniti - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

```
ver os resultados."; var il8n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que  
fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 3'; var  
wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins  
/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_9071&&wpvqas=%%wpvqas%%';  
var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/achad  
o-em-antro-gastrico-voce-acerta-esta-aqui/'; var wpvq_facebook_caption  
= 'Acertei %%score%% em 3 , e você?'; var wpvq_facebook_description =  
'%details%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = '';
```