

Paciente de 48 anos, procura atendimento devido queixas inespecíficas sugestivas de Doença Do Refluxo. Em sua história clínica, chama atenção o fato do paciente ter um irmão e um tio falecidos devido câncer gástrico. Frente a este antecedente e notando um quadro de cancerofobia, o médico solicita exame de endoscopia digestiva alta, com seguinte achado :

Nota : A pesquisa de *H. pylori* pelo método histológico resultou positiva.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



polipo hiperplásico

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"758":"1","759":"0","760":"0","761":"0","762":"0"},"ra98euef":{"154":{"ai0099":"758","e9878":"
```

Os pólipos hiperplásicos respondem por cerca de 75% dos pólipos gástricos em regiões de alta prevalência de infecção por *H. pylori*.

Resultam de um epitélio hiperegnerativo em resposta a um estímulo inflamatório (infecção por *H. pylori*, bordas de anastomose, úlceras, gastrite crônica atrófica). Afeta igualmente homens e mulheres.

Usualmente são assintomáticos e sua descoberta incidental. Eventualmente são grandes o suficiente para causar sangramento e obstrução pilórica. Variam de tamanho, entre 5 a 15 mm, em qualquer parte do órgão e em geral são múltiplos.

Os pólipos hiperplásicos possuem risco de evolução para adenocarcinoma, sendo que até 20% deles podem conter focos de neoplasia em sua superfície.

Todos os pólipos acima de 5 mm devem ser totalmente retirados. Também devem ser colhidas amostras de corpo e antro, para pesquisa de *H. pylori* e presença de displasia.

Na presença de adenocarcinoma além das margens do pólipo, indica-se a gastrectomia ou ESD (Neoplasia precoce).

A vigilância está indicada para pacientes com risco concorrente de gastrite crônica atrófica ou câncer.

Em pacientes com alto risco de câncer (gastrite crônica atrófica estágios OLGA 3 ou 4, história familiar de câncer gástrico, imigrante de áreas de alta incidência de câncer) está indicado acompanhamento com endoscopia a cada um a dois anos.

Em pacientes com baixo risco de câncer (OLGA estágios 1 ou 2), realiza-se somente uma nova endoscopia após seis meses para avaliar a erradicação do *H. pylori* e confirmar a total ressecção do pólipo, não estando indicada vigilância.

Fonte : UptoDate 2018" } } };

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "polipo hiperplasico"; var quizId = 151; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_8521&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/achado-em-exame-de-rotina/'; var wpvq_facebook_caption =  
'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var  
wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```