

Uma nova classificação para lesões vasculares foi proposta por Yano et al., em 2008, baseada em achados endoscópicos do intestino delgado. Tal classificação é útil para determinar a conduta terapêutica, pois lesões classificadas como do tipo 1 são venosas e passíveis de cauterização. Lesões tipo 2 caracterizadas como arteriais (dieulafoy) e tipo 3 como má formações arteriovenosas com componente arterial e venoso deverão ser tratadas com clips hemostáticos ou até mesmo cirurgia .

**Tipo 1a** - eritema puntiforme (<1 mm), com ou sem sangramento em babação

**Tipo 1b** - placa de eritema (poucos mm), com ou sem sangramento em babação

**Tipo 2a** - lesões puntiformes (<1 mm), com sangramento pulsátil

**Tipo 2b** - protrusão vermelha pulsátil, sem dilatação venosa ao redor

**Tipo 3** - protrusão vermelha pulsátil, com dilatação venosa ao redor

**Tipo 4** - outras lesões não classificadas entre as categorias acima

Type 1a:		Punctulate erythema (less than 1 mm) with or without oozing
Type 1b:		Patchy erythema (a few mm) with or without oozing
Type 2a:		Punctulate lesions (less than 1 mm) with pulsatile bleeding
Type 2b:		Pulsatile red protrusion without surrounding venous dilatation
Type 3:		Pulsatile red protrusion with surrounding venous dilatation
Type 4:		Other lesions not classified into any of the above categories

