

Paciente de 88 anos, feminina, com antecedente de insuficiência cardíaca, trombose venosa profunda em uso de anticoagulação oral, colecistectomia há 40 anos, e CPRE há 3 meses por icterícia obstrutiva.


Durante a CPRE foi observado uma estenose em colédoco distal, cuja biópsia e escovado descartaram malignidade. Neste procedimento foi optado pela passagem de prótese metálica auto-expansível totalmente coberta de 10 mm por 4 cm. Na segunda CPRE após 3 meses, houve falha na retirada da prótese metálica devido a migração proximal e crescimento tecidual ao redor da borda distal (overgrowth). Imagens abaixo:



Prótese metálica com migração proximal.



Fluoroscopia: Dilatação da via biliar extra-hepática; tentativa de remoção da prótese com balão sem sucesso.



Falha na remoção da prótese com pinça de corpo estranho devido a crescimento tecidual ao redor da prótese.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Protese metálica retida

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"355":"0","356":"0","357":"0","358":"1","359":"0"},"ra98euef":{"72":{"ai0099":"358","e9878":"
```

As próteses metálicas auto-expansíveis (PMAE) totalmente cobertas são uma alternativa promissora e atraente para as próteses plásticas. E estão sendo cada vez mais utilizadas para o tratamento de estenoses benignas das vias biliares. A grande preocupação com o uso de PMAE em doenças benignas é a possibilidade de dificuldade em sua remoção. A falha na remoção da PMAE pode representar um problema sério, onde mesmo a tentativa de remoção cirúrgica pode ser difícil e prejudicada. A introdução de uma segunda prótese metálica por dentro da primeira (*“SEMS in SEMS” technique*) parece ser uma boa conduta para estes casos. Sempre que possível, a segunda prótese deve ter ao menos o mesmo tamanho da primeira. Publicação com relato de 5 casos (Tringali A et al. *Dig Liver Dis.* 2014) com falha de remoção da prótese, onde uma segunda prótese metálica foi passada, mostrou sucesso na remoção de ambas as próteses em todos os casos (100%). Recomenda-se um período de 14 a 28 dias para nova tentativa de remoção após passagem da segunda prótese.

No caso citado, houve sucesso na remoção de ambas as próteses após 3 semanas da passagem da segunda prótese (10 mm x 6 cm totalmente coberta). Imagem abaixo: A - Visão endoscópica das 2 próteses metálicas. B - Fluoroscopia: *“SEMS in SEMS” technique*. C e D - Sucesso na remoção das próteses.

```
}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Protese metálica retida"; var quizId = 72; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_6531&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/protese-biliar-metalica-retida-qual-melhor-conduta-para-este-caso/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

