



Paciente fem, 57 anos, assintomática, exame de rotina.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Qual o diagnóstico desta lesão na segunda porção duodenal?

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 =  
{"a9374":{"6":"1","7":"0","8":"0","9":"0","10":"0"},"ra98euef":{"2":{"ai0099":"6","e9878":"
```

O linfoma folicular é uma doença rara, que envolve mais frequentemente o duodeno e intestino delgado.\r\n\r\n

O aspecto endoscópico é bem típico, com pequenos nódulos polipoides esbranquiçados que por vezes coalescem formando placas.\r\n\r\n

O curso da doença geralmente é indolente.\r\n\r\n

Doença de Crohn costuma manifestar-se com ulcerações.\r\n\r\n

Estrongiloidíase apresenta um aspecto difuso de edema e alteração das vilosidades.\r\n\r\n

Adensam apresenta uma superfície esbranquiçada e mais regular. Adenocarcinoma é o principal diagnóstico diferencial neste caso.\r\n"} } };

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Qual o  
diagnóstico desta lesão na segunda porção duodenal?"; var quizId = 2; var totalCountQuestions = 1; var  
askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type =  
"WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '/endoscopiaterapeutica.c
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_469&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/qual-o-diagnostico-desta-lesao-na-segunda-porca-
o-duodenal/';
var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```