



Paciente do sexo feminino, 17 anos de idade, relata queixa de diarreia há cerca de dois meses acompanhada por sintomas dispépticos e distensão abdominal, além de perda de 5 kg no período. Ao exame físico, apresenta-se pouco desidratada, com abdome levemente distendido e doloroso à palpação.

```
(function(d, s, id){  
  
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  
  
if (d.getElementById(id)) {return;}  

```

```
js = d.createElement(s); js.id = id;
```

```
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
```

```
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
```

```
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Compartilhe esse quiz para mostrar seus resultados !

Facebook

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Giardíase

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */
```

```
var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 =
```

```
{"a9374":{"984":"1","985":"0","986":"0","987":"0"},"ra98euef":{"200":{"ai0099":"984","e9878":"
```

O diagnóstico de giardíase foi confirmado pelo estudo anatomopatológico.

A Giardia lamblia geralmente se instala no delgado proximal, principalmente no duodeno, porém não invade a mucosa. A sua patogenicidade se dá por ação mecânica, resultante da aderência à superfície da mucosa, produzindo irritação das vilosidades e interferindo na absorção dos nutrientes.

A maioria dos pacientes é assintomática. A infecção sintomática pode se apresentar de forma aguda, com diarreia acompanhada por sintomas dispépticos, como dor epigástrica, náuseas, vômitos e anorexia. A infecção é, geralmente, autolimitada, resolvendo-se em duas a quatro semanas, porém, em alguns pacientes, pode evoluir para cronicidade. Na forma crônica, outros sintomas, como dor abdominal, flatulência, diarreia, esteatorreia e perda de peso, também podem estar presentes.

A infecção por *Giardia* pode provocar alterações mucosas evidentes durante a EDA, incluindo o achatamento das pregas mucosas e, em alguns casos, a hiperplasia linfóide na lâmina própria e na submucosa, como no caso aqui ilustrado. Os nódulos na mucosa podem medir até 5 mm de diâmetro e representam uma hiperplasia reativa de tecido linfóide como resultado da regulação deficiente da produção de células B.

O diagnóstico deve ser confirmado pela identificação dos trofozoítas da *Giardia* em material coletado por biópsia, aspirado duodenal ou citologia. Entre esses métodos, a biópsia parece ser o mais acurado, podendo alcançar uma sensibilidade de 82% a 100%."}}};

```
/* Global var */
```

```
var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results
```

```
var quizName = "Giardiase";
```

```
var quizId = 193;
```

```
var totalCountQuestions = 1;
```

```
var askEmail = false;
```

```
var askNickname = false;
```

```
var forceToShare = false;
```

```
var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false;
```

```
var wpvq_force_continue_button = false;
```

```
var wpvq_browser_page = 0;
```

```
var wpvq_answersStatus = [];
```

```
var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0;

var wpvq_scroll_speed = 750;

var wpvq_autoscroll_next_var = false;

var wpvq_progressbar_content = 'percentage';

var wpvq_wait_trivia_page = 1000;

var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados.";

var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados.";

var wpvq_checkMailFormat = true;

var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1';

var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_9768&&wpvqas=%%wpvqas%%';

var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-10/';

var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?';

var wpvq_facebook_description = '%%details%%';

var wpvq_facebook_picture = null;

var wpvq_redirection_page = '';
```

Acesse o [Endoscopia Terapêutica](#) para tomar contato com mais [artigos comentados](#), [assuntos gerais](#), [casos](#)

[clínicos](#), [quizzes](#), [classificações](#) e mais!



ENDOSCOPIA  
TERAPÊUTICA