



Figura 1. Ecoendoscopia setorial exibindo lobularidade difusa do corpo pancreático associada a estrias longitudinais hiperecoicas.




Figura 2. Mesmos achados da figura anterior, porém com range maior.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Pancreatite Crônica

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 =  
{ "a9374": { "495": "0", "496": "0", "497": "0", "498": "1" }, "ra98euef": { "101": { "ai0099": "498", "e9878": "
```

As imagens ultrassonográficas acima são de um paciente com pancreatite crônica. Nas imagens notamos alguns critérios que corroboram com esse diagnóstico, como: lobularidade difusa do parênquima, alguns

focos de hiperecogenicidade, porém sem sombra acústica; e hiperecogenicidade das margens do ducto pancreático principal.

O último consenso relativo aos critérios necessários para estabelecer o diagnóstico ultrassonográfico de pancreatite crônica foi designado de Classificação de Rosemont. Esta classificação baseou-se na experiência de autoridades na matéria.

Critérios maiores A :

- Focos hiperecoicos com cone de sombra
- Cálculos do ducto pancreático principal

Critério maior B :

- Lobularidade contígua do parênquima

Critérios menores :

- Cistos
- Ducto pancreático principal com contorno irregular
- Ducto pancreático principal dilatado
- Ramos secundários dilatados
- Parede ductal hiperecoica
- Faixas hiperecoicas
- Focos hiperecoicos sem cone de sombra
- Lobularidade não contígua do parênquima

Essa classificação é muito complexa e pouco prática. Os critérios ultrassonográficos mais consistentes para que o diagnóstico de pancreatite crônica seja estabelecido são :

- presença de dois critérios maiores A
- presença de um critério maior A + um critério maior B
- presença de um critério maior A + três critérios menores

}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results  
var quizName = "Pancreatite Crônica"; var quizId = 99; var  
totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false;  
var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false;  
var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var  
wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content =  
'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para  
ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que  
fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1!'; var  
wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kal  
ins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_7542&&wpv  
qas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-5/'; var  
wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var  
wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture  
= null;
```

```
var wpvq_redirection_page = ";
```

