



Paciente masculino, 65 anos, etilista crônico, assintomático, realizou ecoendoscopia que evidenciou uma lesão nodular hipoecoica, homogênea, de limites precisos, em corpo pancreático e medindo cerca de 12 mm em seu maior eixo. Wirsung de calibre normal e o restante do parênquima pancreático sem lesões. Realizada PAAF. O estudo histológico evidenciou altos níveis de cromogranina A e a imuno-histoquímica apresentou Ki 67 elevado.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



TNE

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"592":"0","593":"0","594":"0","590":"0","591":"1"},"ra98euef":{"120":{"ai0099":"591","e9878":"
```

Os tumores neuroendócrinos do pâncreas (TNE) são neoplasias raras, que têm uma incidência de 1 caso em 100 000 pessoas por ano. Com base em estudos de autópsia, descobriu-se que os TNE parecem ser muito mais comuns do que previamente se pensava. Frequentemente são assintomáticos, não sendo, por isso, diagnosticados em vida. Afetam igualmente ambos os sexos, ocorrem em todos os grupos etários, apesar de haver um pico de incidência entre os 30 e os 60 anos de idade e localizam-se na principalmente (48%) na cauda do pâncreas. Apesar de todos os tipos de TNEs, exceto os insulinosas, serem malignos em mais de 50% dos casos, eles perfazem menos de 5% das doenças malignas pancreáticas.

Estes tumores são nomeados de acordo com o hormônio que secretam e estão normalmente associados com a síndrome clínica produzida por esse hormônio.

Em conjunto, essas neoplasias são classificadas como TNEs funcionais e os TNEs não funcionais (tumores do pancreáticos com diferenciação endócrina, mas que não apresentam a síndrome clínica de hipersecreção hormonal). Cerca de 50 a 60% dos tumores neuroendócrinos são tumores não funcionais.

Os sinais e sintomas dos TNEs estão normalmente associados à hipersecreção hormonal, no caso dos tumores funcionais, e às metástases ou à dimensão dos tumores, no caso dos não funcionais.

O diagnóstico patológico depende da confirmação da natureza neuroendócrina das células tumorais. Níveis elevados de cromogranina A são encontrados em 60 a 80% desses tumores. Desta forma, marcadores como a cromogranina A, sinaptofisina, entre outros, podem confirmar sua origem neuroendócrina.

A localização destes tumores é fundamental, por isso, todos os doentes deverão ser submetidos a tomografia axial computadorizada e a cintigrafia com octreótido (Octeoscan). Contudo, outros exames de imagem, como a ressonância magnética (RM), a ecografia transabdominal, a ecoendoscopia (permite o diagnóstico através da punção !) e a ecografia intra-operatória, podem também ser necessários. Embora a terapia clínica possa controlar alguns dos sintomas da hipersecreção hormonal, não tem efeitos no tumor e não impede a doença metastática. Assim, a cirurgia continua a ser o único tratamento potencialmente curativo para estes tumores, mesmo em caso de doença metastática. "}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "TNE"; var quizId = 118; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_7889&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-6/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

