

Paciente do sexo feminino, 67 anos, com anemia e história de episódios frequentes de melena. À endoscopia foi diagnosticada grande variz de fundo gástrico. A paciente foi tratada com injeção de cianoacrilato e lipiodol sendo realizadas 2 punções em locais diferentes. O procedimento transcorreu sem intercorrências, não houve sangramento e a variz ficou bem endurecida sugerindo sucesso na obliteração. Após o procedimento a paciente evoluiu com dispneia e aumento da frequência respiratória. A ausculta pulmonar estava normal. Qual a principal hipótese que deve ser pesquisada?



```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Complicação após tratamento de variz gástrica  
Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"294":"0","295":"0","296":"1","297":"0","298":"0"},"ra98euef":{"60":{"ai0099":"296","e9878":"
```

A obliteração de varizes gástricas com cianoacrilato é um tratamento efetivo e com baixo índice de complicações. Os eventos adversos mais comuns são infecção, ulceração, necrose com perfuração (geralmente se ocorrer injeção fora da variz), ressangramento e a embolização do cianoacrilato. Os eventos embólicos podem ocorrer no baço, pulmão cérebro e até nas coronárias. A incidência de embolia pulmonar por cianoacrilato no tratamento de varizes gástricas descrito na literatura é de até 1% dos casos.

A fisiopatologia da embolia pulmonar envolve um shunt protosistêmico, em especial uma comunicação gastro-renal. Os fatores de risco para esta complicação são injeção muito rápida e de volume maior do que 1 ml de solução por punção.

Como a injeção do cianoacrilato é feita em conjunto com lipiodol que é um contraste radiológico, os

eventos embólicos podem ser diagnosticados através de uma radiografia simples.

O tratamento da embolia pulmonar por cianoacrilato é difícil. A anticoagulação ou a trombólise são ineficazes. Na verdade, além do tratamento sintomático com suplementação de oxigênio a embolectomia cirúrgica ou por radiologia intervencionista e a assistência cardiopulmonar extracorpórea são as únicas alternativas terapêuticas no caso de uma embolia maciça.

Tromboembolismo pulmonar pode ocorrer mas não é a primeira opção logo após a injeção de cianoacrilato em variz de fundo. No caso de broncoaspiração ou descompensação de infecção pulmonar, que também são diagnósticos possíveis, a ausculta pulmonar estaria alterada.

```
}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName =  
"Complicação após tratamento de variz gástrica"; var quizId = 60; var totalCountQuestions = 1; var  
askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type =  
"WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;  
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_6002&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-complicacao-apos-tratamento-de-varizes-gastricas/'; var  
wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =  
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```