

Em se tratando da população pediátrica, é sabido que a realização de biópsias em áreas macroscopicamente normais à endoscopia aumenta sobremaneira o diagnóstico de muitas doenças.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



QUIZ – ENDOSCOPIA PEDIÁTRICA

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 =  
{"a9374":{"865":"0","863":"0","864":"1","866":"0"},"ra98euef":{"176":{"ai0099":"864","e9878":"
```

O guideline de Endoscopia Gastrointestinal Pediátrica da ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) sugere a retirada de fragmentos de biópsias de rotina, mesmo na ausência de anormalidades endoscópicas visíveis, em todas as crianças (0 a 18 anos) submetidas à endoscopia digestiva alta (recomendação fraca\ baixo grau de evidência).

Em pacientes com disfagia, odinofagia, dor torácica ou dificuldade de alimentar-se, a esofagite eosinofílica deve ser descartada e **pelo menos 3 (três) biópsias devem ser realizadas, uma em cada segmento (proximal, médio e distal), independente da aparência endoscópica da mucosa.**

Quando há suspeita da infecção por *Helicobacter Pylori*, **pelo menos 2 (duas) biópsias de ambas as topografias, antro e corpo, devem ser realizadas.**

Em pacientes com perda de peso, diarreia crônica, mal-absorção, anemia, dor abdominal em que há suspeita de doença orgânica, doenças como enterocolite alérgica, doença celíaca, doença do enxerto versus hospedeiro devem ser aventadas. Para biópsia do duodeno, **pelo menos 1 (um) fragmento do bulbo e 4 (quatro) da segunda ou terceira porção duodenal devem ser realizadas.**

Em pacientes em investigação para doença inflamatória intestinal, múltiplas biópsias (2 ou mais por área) de todas as áreas do trato digestivo visualizadas durante o exame devem ser realizadas, mesmo na ausência de lesões macroscópicas.

Referência:

Tringali Andrea et al. Pediatric Gastrointestinal Endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Guideline Executive summary.

Endoscopy 2017; 49: 83-91

Leia mais sobre endoscopia na população pediátrica em:

<http://endoscopiaterapeutica.com.br/diretriz/esge-diretriz-endoscopia-gastrointestinal-pediatria/>

<http://endoscopiaterapeutica.com.br/assuntosgerais/endoscopia-digestiva-pediatria-sao-necessarias-biopsias-de-rotina/>

```
"}"};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "QUIZ – ENDOSCOPIA PEDIÁTRICA"; var quizId = 172; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_9125&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-endoscopia-pediatria/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = '';
```