

Considerando os quadros de esofagite, em qual das situações abaixo não há indicação da realização de biópsias esofágicas ?

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Esofagite e biópsias 2

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"1109":"0","1110":"0","1111":"1","1112":"0","1113":"0"},"ra98euef":{"225":{"ai0099":"1111","e9878":"
```

Conforme guideline publicado em 2015 pela ASGE (The role of endoscopy in the management of GERD), quando a esofagite é observada endoscopicamente, amostras de tecido da mucosa esofágica devem ser obtidas nas seguintes circunstâncias:

- Pacientes imunocomprometidos
- Ulceração irregular ou profunda associada
- Distribuição proximal da esofagite
- Presença de lesão nodular ou com efeito de massa
- Alterações bolhosas sugestivas de pênfigo vulgar
- Suspeita de esofagite eosinofílica (anéis, estriações lineares, placas esbranquiçadas, fragilidade mucosa)
- Alterações compatíveis com esofagite dissecante superficial
- Estenose esofágica irregular ou suspeita de malignidade

Nestas situações, biópsias com pinça e/ou escovado citológico são necessários para excluir outras doenças, incluindo etiologias infecciosas e malignidades. As biópsias teciduais também tem sido recomendadas em pacientes com disfagia sem evidência de esofagite erosiva para avaliação de esofagite eosinofílica.

A obtenção rotineira de biópsias de esôfago ou junção esofagogástrica não é recomendada em pacientes com azia e queimação e achados normais na endoscopia, ou em pacientes com esofagite erosiva distal não complicada, comumente evidenciada em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico.

[ASGE Standards of Practice Committee, Muthusamy, V.R., Lightdale, J.L., Acosta, R.D. et al. The role of endoscopy in the management of GERD. *Gastrointest Endosc.* 2015;81:1305–1310](#)

Veja também:

[Quiz: diagnóstico e tratamento da esofagite eosinofílica](#)

[Esofagite erosiva é suficiente para o diagnóstico de DRGE?](#)

[Esofagite péptica: Classificação de Los Angeles](#)

[Diagnóstico moderno da DRGE: o Consenso de Lyon – O que o endoscopista precisa saber"}}](#)

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Esofagite e biópsias 2"; var quizId = 212; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_10525&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-esofagite-quando-realizar-biopsias/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```