



Homem de 52 anos com queixa de dor epigástrica frequente. Realizou endoscopia digestiva alta demonstrando a alteração acima no bulbo duodenal.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



QUIZ! Lesão duodenal - Qual o diagnóstico?

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"415":"0","416":"0","417":"0","418":"1","419":"0"},"ra98euef":{"84":{"ai0099":"418","e9878":"
```

Metaplasia gástrica é um termo usado para descrever a presença de células do tipo mucosa secretoras gástricas na superfície do epitélio duodenal. A alteração é bastante restrita ao bulbo duodenal e localizada geralmente na porção justa pilórica.

O diagnóstico é baseado na avaliação histológica. É mais comum no sexo masculino e em adultos, sendo um achado incomum nas crianças. Pode ser encontrada na maioria (90%) dos pacientes com história de úlcera duodenal.

A troca do epitélio duodenal por epitélio foveolar gástrico (metaplasia) é devida a uma resposta de defesa ou adaptação ao excesso de ácido no duodeno. A presença da metaplasia gástrica no bulbo possibilita a colonização do duodeno pelo *H. pylori* o que contribui para a ocorrência de duodenite e úlceras.

```
}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "QUIZ!  
Lesão duodenal - Qual o diagnóstico?"; var quizId = 85; var totalCountQuestions = 1; var askEmail =  
false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;  
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '/endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_7074&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-lesao-duodenal-qual-o-diagnostico/'; var  
wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =  
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```