



Paciente de 67 anos, tabagista, assintomático. Durante uma endoscopia de rotina foi identificada a lesão acima, localizada no esôfago médio. Para melhor investigar a lesão foi realizada cromoscopia com Lugol.

Qual o provável diagnóstico?

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Acantose glicogenica quiz

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"783":"0","784":"0","785":"0","786":"1","787":"0"},"ra98euef":{"159": {"ai0099":"786","e9878":
```

A acantose glicogênica ou glicoacantose é uma lesão benigna da mucosa do esôfago e sua prevalência

exata é desconhecida. Quando pesquisada em autópsias, pode atingir até 100%, porém, em exames endoscópicos, estaria em torno de 5 a 15%.

Na endoscopia, estas lesões costumam se apresentar como múltiplas placas elevadas, arredondadas, variando entre 2 mm e 4 mm de diâmetro, mas podendo ser bem maiores. São esbranquiçadas, facilmente vistas ao exame e podem ser encontradas ao longo de todo o esôfago, sendo mais comuns no terço inferior e comumente múltiplas.

À cromoscopia com solução de Lugol, coram-se avidamente obtendo uma tonalidade marrom-escura em razão da grande concentração de glicogênio. Em contra partida, lesões neoplásicas e inflamatórias não se coram.

A acantose glicogênica não causa sintomas e seu significado clínico é desconhecido. Por ser uma lesão sem potencial de malignização e devido ao seu aspecto endoscópico característico, as biópsias sistemáticas não estão indicadas. Todavia, deve ser feito o diagnóstico diferencial endoscópico com lesões como a monilíase, leucoplasia e carcinoma precoce do esôfago.

Referência

Walton Albuquerque, Luiz Cláudio Miranda da Rocha Kleber, Bianchetti de Faria. Tumores Benignos do Esôfago. In: SOBED – Endoscopia diagnóstica e terapêutica pg 213-23."}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Acantose glicogenica quiz"; var quizId = 156; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_8672&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-lesao-plano-elevada-de-esofago/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



var wpvq_redirection_page = "";