



Paciente masculino, 73 anos, com quadro de hematêmese e melena. História de mieloma múltiplo, já tratado e em remissão parcial há um ano. À endoscopia de urgência, foram encontrados os seguintes achados (Figuras 1 e 2).





```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Mieloma múltiplo e lesões gástricas
Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"763":"0","764":"0","765":"0","766":"1","767":"0"},"ra98euef":{"155": {"ai0099":"766","e9878":
```

O plasmocitoma extramedular pode ocorrer em até 20% dos casos de mieloma múltiplo. O trato respiratório é o mais acometido, em 82,2%. O trato gastrointestinal está envolvido em torno de 5% das vezes, sendo um sinal de mau prognóstico. O intestino delgado é o órgão mais envolvido, seguido do estômago, cólon e esôfago.

Os sintomas normalmente são inespecíficos: anorexia, dor abdominal, perda ponderal, náuseas.

Na endoscopia, plasmocitomas gástricos se apresentam como massas nodulares ulceradas, pregas gástricas irregulares e espessadas. A imunohistoquímica desempenha um papel importante no diagnóstico, diferenciando-os de tumores estromais, linfomas e adenocarcinomas.

A hemorragia digestiva não é comum. Quando presente, o papel da endoscopia no tratamento vai depender da localização e extensão da doença, sendo limitado em pacientes com infiltração difusa do estômago. Nesses casos, a terapêutica pode envolver desde radioterapia, até a gastrectomia.

O bortezomib, um inibidor de proteassoma utilizado para mielomas quimiorresistentes, tem como efeito colateral mais característico a neuropatia periférica. Apesar de efeitos colaterais gastrointestinais como náuseas e vômitos serem frequentes e de serem descritos até mesmo casos de hemorragias digestivas com o seu uso, o aspecto endoscópico ulceroinfiltrativo gástrico não corresponde à lesão medicamentosa, aspecto que foi descartado com os exames anatomopatológico e imunohistoquímico. O mesmo raciocínio pode ser feito com relação à insuficiência renal, situação em que sintomas gastrointestinais são comuns, porém não há o aspecto ulceroinfiltrativo e o exame anatomopatológico define o diagnóstico diferencial.

Agradeço a colaboração do Dr. Luciano Lenz na elaboração do Quiz.

Referências Bibliográficas

1. Alexiou C, Kau RJ, Dietzfelbinger H, Kremer M, Spiess JC, Schratzenstaller B, Arnold W. Extramedullary plasmacytoma: tumor occurrence and therapeutic concepts. *Cancer* 1999 Jun 1;85:2305–14.
2. Yasar, B, Gunes, P, et al. Extramedullary relapse of multiple myeloma presenting as massive upper gastrointestinal bleeding: a rare complication. *Korean J Intern Med.* 2015 Jul;30(4):538-9. doi: 10.3904/kjim.2015.30.4.538. Epub 2015 Jun 29.
3. K.D. Nolan, M.C. Mone, E.W. Nelson, Plasma cell neoplasms. Review of disease progression and report of a new variant, *Surg. Oncol.* 14 (2005) 85–90.
4. 4 - D. Chen, M. Frezza, S. Schmitt, J. Kanwar, and Q.P. Do. Bortezomib as the First Proteasome Inhibitor Anticancer Drug: Current Status and Future Perspectives. *Curr Cancer Drug Targets.* 2011 March ; 11(3): 239–253."}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Mieloma múltiplo e lesões gástricas"; var quizId = 152; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '/endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_8536&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-mieloma-multiplo-e-lesoes-gastricas/'; var  
wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =  
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```



Quiz elaborado por Crislei Casamali