



Paciente do sexo feminino com 72 anos e anemia crônica desde a juventude. Relata episódios frequentes de melena e epistaxe. Tem um irmão e uma irmã com sintomas semelhantes.

No exame físico notam-se lesões avermelhadas nos lábios e língua.

Realizou endoscopia digestiva alta que mostrou múltiplas angiectasias gástricas, bulbares, de segunda e terceira porção duodenal. O restante do trato gastrointestinal não foi estudado até o momento.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Angiectasias gastro duodenais
Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"580":"0","581":"1","582":"0","583":"0","584":"0"},"ra98euef":{"118": {"ai0099":"581","e9878":
```

As angiectasias são lesões vasculares frequentes do trato gastrointestinal e as mais comuns do intestino delgado. Elas geralmente são múltiplas e representam a principal causa de hemorragia gastrointestinal média.

A Telangiectasia Hemorrágica Hereditária ou Doença de Osler-Weber-Rendu é uma condição rara e pode acometer todo o trato gastrointestinal. As lesões geralmente são múltiplas e tendem a apresentar uma arborização maior do que as angiectasias usuais.

O diagnóstico é feito quando três dos quatro critérios de Curação estão presentes:

- Epistaxe
- Telangiectasias cutâneas
- Lesões vasculares viscerais (Angiectasias no TGI)
- História familiar

Quando apenas 2 critérios estão presentes o diagnóstico deve ser considerado como possível.

A doença é autossômica dominante e os testes genéticos são disponíveis para algumas das mutações.

O tratamento preferido das angiectasias é a cauterização endoscópica. Estas lesões costumam apresentar uma alta taxa de recorrência, especialmente em pacientes com a forma hereditária.

Quando o acometimento é muito extenso e inviabiliza o tratamento endoscópico, existem opções de tratamento medicamentoso. A Talidomida tem demonstrado bons resultados nestes pacientes e também existem estudos com o uso de terapia hormonal e de bevacizumab.

Em relação às outras opções:

- A ectasia vascular do antro gástrico é composta por várias angiectasias nesta localização e é relacionada à hipertensão portal, insuficiência renal e doenças do colágeno.
- As angiectasias causadas pelo uso de anti inflamatório não costumam apresentar um acometimento tão extenso e não são associadas com epistaxe e história familiar.
- As lesões vasculares acometendo a pele e o trato gastrointestinal na síndrome de Blue Rubber Bleb Nevus são os hemangiomas.
- A síndrome de Von Hippel Lindau é caracterizada por cistos pancreáticos, renais, de epidídimo e hemangioblastomas ou angiomas de retina e SNC.

```
}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName =  
"Angiectasias gastro duodenais"; var quizId = 116; var totalCountQuestions = 1; var askEmail =  
false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type =  
"WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var  
wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus  
resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterap  
eutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_7877&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var  
wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-multiplas-angiectasias-  
gastrointestinais/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var  
wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = ";
```