



Paciente de 56 anos, na colonoscopia de rotina foi identificada e ressecada esta lesão em monobloco após elevação com injeção salina. Os achados do exame anatomopatológico foram:

- Adenocarcinoma bem diferenciado em adenoma túbulo-viloso com displasia de alto grau
- Invasão submucosa (SM1 - 3,0 mm).
- Invasão vascular ou perineural não detectadas
- Base do pólipó / margens livres

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Neoplasia precoce de reto. Qual a conduta?

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"121":"0","122":"0","123":"1","124":"0","125":"0"},"ra98euef":{"25":{"ai0099":"123","e9878":"
```

Os critérios de cura para ressecção endoscópica da neoplasia precoce de reto, segundos diretrizes da sociedade japonesa de endoscopia são:

margens livres;

adenocarcinoma bem ou moderadamente diferenciado;

invasão da submucosa menor que 1.000 micras (1 mm);

sem invasão vascular e "budding" de baixo grau.

Respeitando estes critérios, a chance de metástases linfonodais é desprezível, e a sobrevida a longo prazo é semelhante à ressecção cirúrgica. No entanto, existem raríssimos casos de metástases à distância em pacientes com adenocarcinoma invadindo a submucosa, apesar de estarem dentro dos limites estabelecidos pelos guidelines.

Portanto, não devemos esquecer de fazer o acompanhamento destes pacientes com colonoscopia, CEA e tomografia (intervalo ideal ainda não foi estabelecido).

No caso apresentado, a invasão da submucosa foi maior que 1.000 micras (3 mil micras). Portanto, a ressecção cirúrgica está indicada para realizar a dissecação linfonodal." } };

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Neoplasia precoce de reto. Qual a conduta?"; var quizId = 25; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_1984&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-neoplasia-precoce-de-reto-qual-a-conduta/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```