

## QUIZ ! O que fazer frente a esta complicação? - julho 2016

Por Renzo Feitosa Ruiz - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

---

Paciente feminina, 87 anos, acamada devido a estado avançado de Mal de Alzheimer. Solicitaram gastrostomia endoscópica para complementação nutricional. No momento do procedimento você identifica a complicação mostrada na imagem abaixo. O que fazer ?



```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Hematoma pós punção para realização de GTT  
Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"320":"0","319":"0","321":"0","322":"1","323":"0"},"ra98euef":{"65":{"ai0099":"322","e9878":"
```

Sangramentos da parede gástrica geralmente ocorrem logo após a punção para confecção da gastrostomia endoscópica percutânea (PEG) e são causados na maioria das vezes por lesões inadvertidas de vasos da parede anterior. Uma das apresentações mais frequentes é a aparição de hematoma peri-sonda.

Normalmente é auto-limitado e pode ser tratado apertando-se o anteparo externo contra a pele; assim o anteparo interno tende a cessar a hemorragia pelo efeito compressivo.

Essa compressão deve ser liberada num prazo máximo de 48 horas para prevenir necrose da mucosa e o desenvolvimento de úlceras de pressão na pele. Caso haja sinais de sangramento vultuoso com instabilidade hemodinâmica, a intervenção cirúrgica não deve ser postergada.

```
"}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Hematoma pós punção para realização de GTT"; var quizId = 65; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

## QUIZ ! O que fazer frente a esta complicação? - julho 2016

Por Renzo Feitosa Ruiz - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

---

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_6168&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'h  
ttps://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-o-que-fazer-no-momento-em-que-se-identifica-  
complicacao-mostrada-na-imagem/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e  
você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```