



Em qual das situações abaixo esta indicada realização de antibioticoterapia profilática ?

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Profilaxia antibiótica em CPRE

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"126":"0","127":"0","128":"1","129":"0","130":"0"},"ra98euef":{"26":{"ai0099":"128","e9878":"
```

Conforme consenso da ASGE (American Society for Gastrointestinal Endoscopy), em procedimento de CPRE, apesar de bacteremia ser comum, a profilaxia bacteriana (com antibióticos), está indicada apenas quando não se conseguiu um clareamento total da via biliar (drenagem completa), ou este foi conseguido com dificuldade (tumores hilares volumosos), sendo que o uso de antibióticos deve ser continuado após o procedimento.

Parece haver benefício no uso de profilaxia em pacientes com pseudocisto (que será submetido a manipulação) ou netropenia, porém, ainda sem evidência clínica.

Vale lembrar que paciente com diagnóstico presuntivo ou de certeza de colangite já devem estar em uso de antibióticos (tratamento), não sendo indicada dose extra (profilática) por conta do procedimento. Você pode ler este consenso na íntegra abaixo."}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Profilaxia antibiótica em CPRE"; var quizId = 26; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '/endoscopiaterapeutica.c
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_1914&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-profilaxia-antibiotica-em-cpre/'; var
wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

[Clique aqui e acesse o consenso sobre antibioticos em endoscopia](#)

