



Clique na assertiva que apresenta a conduta correta em relação ao rastreamento e manejo de displasias em paciente com doença inflamatória intestinal.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Abordagem de displasia em pacientes com doença inflamatória intestinal

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"116":"0","117":"1","118":"0","119":"0","120":"0"},"ra98euef":{"24":{"ai0099":"117","e9878":"
```

Publicado e elaborado pela "American Society for Gastrointestinal Endoscopy" (ASGE) em conjunto com a "American Gastroenterological Association" (AGA), o SCENIC versa sobre o rastreamento e manejo de displasia na doença inflamatória intestinal e tem sido o principal guia de conduta nessa população de pacientes.

Segundo essa diretriz, preferencialmente, o rastreamento de displasia em pacientes com doença inflamatória intestinal deve ocorrer com uso de aparelhos de luz branca de alta definição, utilizando-se das técnicas de cromoscopia com índigo cármin e azul de metileno, e não priorizando técnicas como NBI.

Quanto ao manejo de displasias encontradas, o consenso sugere que as displasias encontradas e ressecadas, assim como as displasias invisíveis, sejam abordadas e seguidas com a realização de colonoscopias com uso de técnica adequada, uso de aparelhos de alta definição e com uso de cromoscopia.

Veja mais informações neste [post.}}}}](#):

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Abordagem de displasia em pacientes com doença inflamatória intestinal"; var quizId = 24; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var
```

```
wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;  
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_2032&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'h  
ttps://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-qual-a-conduta-mais-correta-na-abordagem-de-displasia-  
em-pacientes-com-doenca-inflamatoria-intestinal/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%%  
em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

