


Paciente do sexo feminino, 25 anos, com antecedente de pancreatite aguda grave há cerca de 2 semanas. Apresentou boa evolução clínica, estando assintomática no momento, aguardando colecistectomia. Apresenta porém, abaulamento indolor palpável em epigastro e hipocôndrio esquerdo. Para melhor avaliação, foi solicitada TC de abdomen, que evidenciou coleção líquida homogeneia em cabeça e corpo de pâncreas, com cerca de 10 cm de diâmetro, sem gás ou sinais de sangramento.



Coleção líquida em cabeça e corpo pancreático.

Também foi realizada endoscopia digestiva alta que observou :



Abaulamento fixo de parede posterior de corpo gástrico.

Com base na história e exame :

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Coleções pancreáticas

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

Este quiz foi criado com [WordPress Viral Quiz ?](#).

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"264":"0","265":"0","266":"1","267":"0","268":"0"},"ra98euef":{"54":  
{"ai0099":"266","e9878":
```

Para coleções secundárias a pancreatite aguda, com conteúdo homogêneo e circunscrita, o diagnóstico de pseudocisto se impõe. Em paciente assintomáticos, sem sinais de infecção do cisto, deve-se aguardar um período de 4 semanas, para melhor maturação das paredes do cisto e assim, proceder a drenagem, de forma mais segura.

[Clique aqui e reveja outros conceitos sobre coleções pancreáticas](#)

```
}}};
```

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Coleções  
pancreáticas"; var quizId = 54; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname =  
false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;  
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_5813&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-qual-alternativa-correta/'; var wpvq_facebook_caption =  
'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var  
wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```