

Paciente do sexo masculino, com cirrose por vírus B, evoluindo com piora da anemia e episódios de melena. Qual o diagnóstico mais provável?

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Qual o diagnóstico

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"390":"0","391":"0","392":"0","393":"1","394":"0"},"ra98euef":{"79":{"ai0099":"393","e9878":"
```

A ectasia vascular antral (GAVE em inglês) é uma forma pouco frequente de hemorragia digestiva alta. Ela pode ser responsável por até 4% dos sangramentos digestivos altos não varicosos. O diagnóstico é baseado principalmente no padrão endoscópico e, em casos duvidosos, na histologia. O aspecto endoscópico altamente sugestivo é caracterizado por manchas avermelhadas de padrão vascular, organizadas em estrias radiais a partir do piloro (estômago em melancia) ou distribuídas de forma difusa (estômago em favo de mel) no antro gástrico. O padrão histológico, apesar de não ser patognomônico, é caracterizado por ectasia dos capilares da mucosa, trombose focal e proliferação de células fusiformes.

O principal diagnóstico diferencial é a Gastropatia Hipertensiva Portal (que pode até coexistir com o GAVE já que 30 % dos pacientes com GAVE também tem Cirrose hepática). A gastropatia hipertensiva costuma acometer principalmente no corpo e o fundo e é caracterizada por um enantema de padrão em mosaico com pontos avermelhados.

O tratamento endoscópico, particularmente através da coagulação com plasma de argônio e mais recentemente com ligaduras elásticas, tem se mostrado bastante efetivo e deve ser considerado como a primeira escolha nos pacientes com sangramento associado ao GAVE.

Fuccio et al. World J Gastrointest Endosc 2013 January 16; 5(1): -13" } } };

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Qual o diagnóstico"; var quizId = 80; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname =
```

```
false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;  
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_6748&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-qual-o-diagnostico-2/'; var wpvq_facebook_caption =  
'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var  
wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```