

Paciente do sexo feminino, de 91 anos de idade, assintomática. Antecedente médico de gastrectomia com reconstrução a Billroth tipo II há 42 anos por doença ulcerosa péptica. Em exame endoscópico, foi evidenciada em fundo cego de alça aferente a lesão apresentada.



Qual a sua suspeita diagnóstica?

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); })(document, 'script', 'facebook-jssdk');
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

[Mostrar meu resultado >>](#)



Qual o diagnóstico desta lesão no coto duodenal?

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

[Facebook](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"141":"0","142":"0","143":"0","144":"0","145":"1"}, "ra98euef":{"29": {"ai0099":"145", "e9878":"
```

O anatomo-patológico e perfil imunohistoquímico demonstraram linfoma de pequenas células B com baixo índice proliferativo.

Como os tumores epiteliais e mesenquimais são incomuns no intestino delgado, os linfomas constituem uma proporção significativa (30-50%) de todos os tumores malignos neste local.

Os linfomas de tecido linfóide associado à mucosa (MALT) são os linfomas mais comuns em todo intestino delgado e cólon."}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Qual o diagnóstico desta lesão no coto duodenal?"; var quizId = 29; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var  
wpvq_wait_trivia_page = 1000;  
  
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var  
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;  
  
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.c  
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_1715&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =  
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-qual-o-diagnostico-desta-lesao-no-coto-duodenal/'; var  
wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =  
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```