



Paciente masculino, 46 anos. Relata sangramento baixo notado durante as evacuações há 2 meses. Tem histórico de ressecção de metástase de melanoma cerebral há 10 meses, porém sem sítio primário identificado.

Realizou colonoscopia onde identificou-se as duas lesões acima; sendo uma localizada no reto, e a outra no cólon transverso.

Na sua opinião qual seria a hipótese diagnóstica mais provável?

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



QUIZ - LESÃO DE CÓLON E RETO

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"730":"0","731":"0","732":"1","733":"0","734":"0"},"ra98euef":{"148"
```

:"ai0099":"732","e9878":"

As 2 lesões foram ressecadas endoscopicamente e a histologia confirmou tratar-se de melanoma metastático. Após este diagnóstico, o paciente foi submetido à uma endoscopia digestiva alta que identificou várias outras lesões gástricas com biópsias também confirmando melanoma metastático.

Para acertar esta questão é importante levar em conta a história do paciente e o aspecto das lesões. Claro que a imagem endoscópica isolada não pode dar um diagnóstico de certeza, mas avaliando o caso podemos inferir uma maior probabilidade de se tratar de um melanoma metastático.

O adenoma não degenerado costuma apresentar padrão foveolar regular bem característico, diferente do visto nessas lesões. O hamartoma pode se apresentar com erosões, sangramento, exsudato e fibrina, mas nosso paciente aqui está fora da faixa etária onde estas lesões são mais comuns. O GIST é uma lesão subepitelial. Com isso nos sobra o melanoma.

Melanoma primário de cólon é extremamente raro e como o paciente apresenta duas lesões é mais sugestivo de se tratar de metástases do que do foco primário não identificado.

Os locais mais comuns de metástases do melanoma são : cérebro, fígado, pulmão e ossos, porém, menos frequentemente podem acometer o trato gastrointestinal.

O melanoma metastático sem uma lesão cutânea, ocular ou mucosa primária pode ocorrer em até 1-4% dos casos. Isso acontece devido à lesão cutânea ter o potencial de regredir e desaparecer.

As lesões do trato gastrointestinal muitas vezes podem ser amelanóticas e apresentar histologia atípica, o que dificulta ainda mais o diagnóstico.

O prognóstico do melanoma metastático é ruim, com sobrevida menor que 1 ano para pacientes onde a doença não é ressecável.

REFERÊNCIAS

Reddy et all. A rare case of metastatic malignant melanoma to the colon from an unknown primary. <http://dx.doi.org/10.1155/2014/312902>

Tessier et all. Melanoma metastatic to the colon: Case series. DOI:[10.1097/01.DCR.0000059657.64526.B6](https://doi.org/10.1097/01.DCR.0000059657.64526.B6)

Gaida et all. Melanoma as a surprising solution to the puzzle of intestinal obstruction. [10.1590/abd1806-4841.20164685](https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20164685)}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "QUIZ - LESÃO DE CÓLON E RETO"; var quizId = 146; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

QUIZ! Qual o seu palpite sobre estas lesões no cólon e reto? - novembro 2017

Por Ivan R B Orso - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0;
var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var
wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var
i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '/endoscopiaterapeutica.c
om.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_8440&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url =
'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-qual-o-seu-palpite-sobre-estas-lesoes-no-colon-e-reto/';
var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description =
'%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = "";
```