

Paciente de 52 anos, feminino, em investigação de dor abdominal de leve intensidade em FID há 2 meses. Realizou colonoscopia, que evidenciou abaulamento em topografia de óstio apendicular. Consistência amolecida ao toque.



Qual seria a sua principal hipótese diagnóstica para as imagens apresentadas?



Postado por
Juliana Trazzi Rios
Médica do serviço de endoscopia do Instituto do Coração (InCor)
Especialização em Endoscopia Oncológica no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP).

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Qual seria a sua hipótese diagnóstica para este achado no ceco?

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"146":"1","147":"0","148":"0","149":"0","150":"0"},"ra98euef":{"30":  
{"ai0099":"146","e9878":"
```

Mucocele de apêndice é uma patologia com predominância em mulheres (4:1) com mais de 50 anos. Geralmente é assintomática, mas pode se manifestar com dor em fossa ilíaca direita.

É uma patologia de difícil diagnóstico, podendo ser confundida com apendicite aguda ou cisto ovariano. Cerca de 25 a 50% são achados incidentais ao ato cirúrgico.

A colonoscopia apresenta um papel fundamental no diagnóstico. Importante ficarmos atentos a alterações sutis como abaulamento em topografia do apêndice até alterações mais evidentes como uma massa eritematosa, com o orifício apendicular central, conhecido como "sinal do vulcão", que é um achado ocasional, porém altamente sugestivo. Mais raramente, pode-se observar a exteriorização de muco, tornando o diagnóstico mais fácil.

A biópsia geralmente resulta em mucosa normal, devido à origem submucosa da lesão.

A conduta é cirúrgica, visto a possibilidade de cistoadenocarcinoma mucinoso. Sua ruptura pode levar a pseudomixoma peritoneal.

Portanto, é muito importante o colonoscopista estar atento a este diagnóstico e não considerar como achado normal. (Zanati SA, et al. Colonoscopic diagnosis of mucocele of the appendix.

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY Volume 62, No. 3 : 2005)"} } };

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Qual seria a sua hipótese diagnóstica para este achado no ceco?"; var quizId = 30; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_1648&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-qual-seria-a-sua-hipotese-diagnostica-para-este-achado-no-ceco/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

