


Paciente com 22 anos, sem antecedentes patológicos, refere quadro de dor retroesternal e odinofagia há 2 dias. Realata apenas estar realizando tratamento com antibiótico (não sabe o nome) para DST há cerca de 4 dias. Nega qualquer outra queixa.

Realizada endoscopia no mesmo dia, que evidenciou em esôfago distal as seguintes alterações :



```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

QUIZ !! - Qual sua hipótese ? - setembro 2016

Por Guilherme Sauniti - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



qual sua melhor hipótese - esofagite
Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 =  
{ "a9374": { "385": "0", "386": "0", "387": "1", "388": "0" }, "ra98euef": { "78": { "ai0099": "387", "e9878": "
```

A impactação (Pill Esophagitis) é a forma mais comum de lesão do esôfago induzida por medicamentos. A história clínica é a chave para o diagnóstico, podendo até mesmo não se realizar a endoscopia. Em geral, o paciente relata ter ingerido o comprimido com pouco volume de água, ou antes de dormir, e vindo a apresentar, logo em seguida, dor retroesternal e odinofagia. Os locais mais comuns de impactação são: esôfago superior, arco da aorta e logo acima da TEG.

As medicações podem causar lesões pelo contato prolongado, ou ação local de medicamentos (osmolaridade alta por exemplo). Os mais frequentes são os AINES, bifosfonados e antibióticos (destes, o mais comum é a doxiciclina)

Bibliografia :

[Seminerio J, McGrath K, Arnold CA, Voltaggio L, Singhi AD. Medication-associated lesions of the GI tract. Gastrointest Endosc. 2014 Jan;79\(1\):140-50. doi: 10.1016/j.gie.2013.08.027}}}}](#)

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-  
results var quizName = "qual sua melhor hipotese - esofagite"; var  
quizId = 79; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var  
askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type =  
"WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false;  
var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var  
wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content =  
'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var il8n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para  
ver os resultados."; var il8n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que  
fornecer um nickname para ver seus resultados."; var  
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var  
wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins  
/kalins-pdf-creation-  
station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_6704&&wpvqas=%%wpvqas%%';  
var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-  
qual-sua-hipotese-4/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%%  
em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var  
wpvq_facebook_picture = null;
```



```
var wpvq_redirection_page = '';
```