



Teste se você realmente sabe indicar!

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return;} js =  
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); })(document, 'script', 'facebook-jssdk');
```

Facebook

QUIZ! Rastreamento do Cancer Colorretal - setembro 2018

Por Luana Borges - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Luana - rastreamento CCR

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"893":"0","894":"1","895":"0","896":"0","897":"0"},"ra98euef":{"182": {"ai0099":"894","e9878":}}
```

É inquestionável o benefício dos programas de rastreamento na detecção e remoção das lesões precursoras, com conseqüente redução da incidência e da mortalidade pelo câncer colorretal.

Cada país adota suas políticas de saúde de acordo com a incidência local, a aderência populacional, mas principalmente, levando em consideração os recursos disponíveis.

Os programas de rastreamento invariavelmente incluem em seu arsenal os testes fecais (pesquisa de sangue oculto pelos métodos do guaiaco ou imunoquímico altamente sensíveis) e os exames estruturais (colonoscopia, retossigmoidoscopia e colonografia por TC).

Para os adultos de **médio risco e assintomáticos**, recomenda-se o início do rastreio aos **50 anos** - idealmente por colonoscopia, que pode ser substituída pelo teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes altamente sensível, para os pacientes que se recusarem a realizar o exame endoscópico. No caso dos afrodescendentes, o rastreio pode ser iniciado aos 45 anos.

Indivíduos de **alto risco** (histórico familiar de câncer colorretal ou adenoma avançado em parente de primeiro grau), devem iniciar o rastreamento 10 anos antes do caso índice, ou aos 40 anos – o que ocorrer primeiro! A mesma recomendação pode ser aplicada à pessoas com parente de primeiro grau acometidos por pólipos serrilhados avançados – adenoma séssil serrilhado ou adenoma serrilhado tradicional, maiores que 1 cm ou associados à displasia. Ainda para pacientes de alto risco, o intervalo adequado para nova colonoscopia, considerando que o exame prévio não tenha identificado lesões adenomatosas, é de 5 anos.

Recentemente, a American Cancer Society divulgou recomendação de que o rastreamento para pacientes de médio risco deva se iniciar aos 45 anos. Ainda é precipitado afirmar que tal recomendação seja uma verdade para todas as realidades e para todas as populações. Entretanto, em razão importância da referida Sociedade e dado o altíssimo fator de impacto da revista onde foi publicado o artigo, é possível presumir uma tendência futura na alteração da idade de início do rastreamento do câncer colorretal.

Por fim, para pacientes que se recusam ou oferecem resistência à realização da colonoscopia como forma de rastreio, certamente há benefício em oferecer métodos alternativos e tentar garantir a aderência ao programa: **O MELHOR TESTE É AQUELE QUE É FEITO.**

REFERÊNCIAS:

Colorectal cancer screening: Recommendations for physicians and patients from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer Gastrointest Endosc July 2017.

Colorectal Cancer Screening for Average-Risk Adults: 2018 Guideline Update from the American Cancer Society CA Cancer J Clin 2018.

}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Luana - rastreamento CCR"; var quizId = 177; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;

var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;

var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var wpvq_checkMailFormat = true;

var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_9441&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-rastreamento-do-cancer-colorretal/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;

var wpvq_redirection_page = '';

