



Paciente sexo feminino, 64 anos de idade, portadora de sintomas dispépticos, submetida a EDA com os seguintes achados. Qual é o diagnóstico dessas alterações em segunda porção duodenal?

```
(function(d, s, id){  
  
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  
  
  if (d.getElementById(id)) {return;}  
  
  js = d.createElement(s); js.id = id;  
  
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";  
  
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);  
  
})(document, 'script', 'facebook-jssdk');
```

QUIZ !!! Teste seus conhecimentos !!! - junho 2018

Por Daniela Medeiros Milhomem Cardoso - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

Compartilhe esse quiz para mostrar seus resultados !

Facebook

Facebook

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



QUIZ ! Linfoma

Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */
```

```
var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"829":"0","830":"0","831":"1","832":"1","833":"0"},"ra98euef":{"168":{"ai0099":"832","e9878":"
```

LINFOMA FOLICULAR DE DUODENO

Os linfomas foliculares ou linfomas nodulares são originários dos linfócitos B e constituem um grupo de lesões pouco agressivas, que respondem bem a tratamento, mesmo quando descobertas em estádios avançados. Recentemente o acometimento isolado do trato gastrointestinal tem sido descrito. As translocações t(14:18) ocorrem de forma similar em quadros nodais e em quadros com acometimento exclusivo do TGI.

Os linfomas foliculares do TGI são clinicamente indolentes e costumam não se associar a sintomas específicos. Recentemente alguns estudos e séries de casos têm apontado para uma predileção dessas lesões pela segunda porção duodenal. Entretanto, elas podem se localizar em qualquer ponto do TGI. Para as lesões localizadas isoladamente em duodeno, o prognóstico costuma ser bastante favorável, com boa resposta ao tratamento e sobrevida livre de doença superior a 95% em 5 anos.

Macroscopicamente costumam se manifestar como aspecto bastante típico: diminutos pólipos ou lesões micronodulares √ microgranulares com coloração pálida. Por vezes essas pequenas lesões podem apresentar-se com confluência. Não é comum observar enantema, erosões ulcerações ou lesões com aspecto infiltrativo.

Durante magnificação é possível observar vilosidades alargadas, spots brancos opacos e aspecto capilar em “carretel” são alterações comuns.

O tratamento do linfoma folicular envolve uma variedade de situações que dependem do estadiamento, da localização das lesões e de fatores relacionados aos pacientes. Há a opção “watch and wait” , ou seja, manter apenas seguimento endoscópico, a depender da condição clínica do paciente e para lesões restritas a um segmento do TGI. O tratamento quimioterápico envolve esquemas com rituximab isolado ou em associação com outros quimioterápicos e há a opção de tratamento cirúrgico para casos selecionados.

REFERÊNCIA:

1. Takata K. Et al. Primary gastrointestinal follicular lymphoma involving the duodenal second portion is a distinct entity: A multicenter, retrospective analysis in Japan. *Cancer Sci* 2016; 12(8): 1532-6.
2. Iwamuro M et al. [Magnifying Endoscopic Observation of Duodenal Involvement of Follicular Lymphoma before and after Chemotherapy. Intern Med. 2015;54\(14\):1741-5](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

```
-  
-  
-  
-  
"}}};  
  
/* Global var */  
  
var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results  
  
var quizName = "QUIZ ! Linfoma";  
  
var quizId = 167;  
  
var totalCountQuestions = 1;  
  
var askEmail = false;  
  
var askNickname = false;  
  
var forceToShare = false;  
  
var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";  
  
var wpvq_hideRightWrong = false;  
  
var wpvq_refresh_page = false;  
  
var wpvq_force_continue_button = false;  
  
var wpvq_browser_page = 0;  
  
var wpvq_answersStatus = [];  
  
var wpvq_countQuestions = false;  
  
var wpvq_scroll_top_offset = 0;  
  
var wpvq_scroll_speed = 750;  
  
var wpvq_autoscroll_next_var = false;
```

QUIZ !!! Teste seus conhecimentos !!! - junho 2018

Por Daniela Medeiros Milhomem Cardoso - Endoscopia Terapêutica - <https://endoscopiaterapeutica.com.br>

[var wpvq_progressbar_content = 'percentage':](#)

[var wpvq_wait_trivia_page = 1000:](#)

[var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados.";](#)

[var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados.";](#)

[var wpvq_checkMailFormat = true:](#)

[var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1':](#)

[var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_9029&&wpvqas=%%wpvqas%%':](#)

[var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/quiz-teste-seus-conhecimentos/':](#)

[var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?':](#)

[var wpvq_facebook_description = '%%details%%':](#)

[var wpvq_facebook_picture = null:](#)

[var wpvq_redirection_page = "':](#)

