

Paciente do sexo feminino, 67 anos, com história de episódios frequentes de melena e anemia . Foi encaminhada para avaliação de volumosa lesão subepitelial no fundo gástrico.

```
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
```

Facebook

---

Apenas nos diga quem você é para ver o resultado!

Mostrar meu resultado >>



Lesão subepitelial de fundo gástrico  
Acertei %%score%% em %%total%%

Compartilhe seus resultados

---

Facebook

Facebook

Twitter

Google+

---

Este quiz foi criado com [WordPress Viral Quiz ?](#).

```
/* JS debug. Use $_GET['wpvq_js_debug'] to enable it. */ var wpvq_js_debug = false;
```

```
var wpvq_ans89733 = {"a9374":{"253":"0","254":"0","255":"1","256":"0","257":"0"},"ra98euef":{"52":{"ai0099":"255","e9878":"
```

Esta é uma volumosa variz de fundo gástrico, pseudotumoral, tipo IGV1, confirmada pela ecoendoscopia. Se durante o exame ecoendoscópico for utilizado doppler, é possível identificar intenso fluxo sanguíneo na lesão.

Como a paciente tem anemia importante e vários episódios de melena prévios a variz de fundo deve ser considerada um importante foco do sangramento e tem indicação de tratamento endoscópico.

Segundo as diretrizes do Baveno VI, a primeira escolha no tratamento endoscópico das varizes de fundo gástrico é o adesivo tissular N-butil-cianoacrilato. Nas lesões grandes é recomendada uma reavaliação com injeção adicional de cianoacrilato após 2-4 semanas do episódio inicial. Além disso, a profilaxia secundária deve ser realizada com a utilização dos beta bloqueadores não seletivos.

Para saber um pouco mais sobre o consenso de Baveno VI, que fala sobre o tratamento da hipertensão portal e suas complicações, acesse o link abaixo.

<http://endoscopiaterapeutica.com.br/assuntosgerais/baveno-vi-o-que-ha-de-novo/>}}};

```
/* Global var */ var wpvq_front_quiz = true; // useful for wpvq-front-results var quizName = "Lesão subepitelial de fundo gástrico"; var quizId = 52; var totalCountQuestions = 1; var askEmail = false; var askNickname = false; var forceToShare = false; var wpvq_type = "WPVQGameTrueFalse";
```

```
var wpvq_hideRightWrong = false;
```

```
var wpvq_refresh_page = false; var wpvq_force_continue_button = false; var wpvq_browser_page = 0; var wpvq_answersStatus = []; var wpvq_countQuestions = false;
```

```
var wpvq_scroll_top_offset = 0; var wpvq_scroll_speed = 750;
```

```
var wpvq_autoscroll_next_var = false; var wpvq_progressbar_content = 'percentage'; var wpvq_wait_trivia_page = 1000;
```

```
var i18n_wpvq_needEmailAlert = "Você precisa fornecer um email para ver os resultados."; var i18n_wpvq_needNicknameAlert = "Você tem que fornecer um nickname para ver seus resultados."; var
```

```
wpvq_checkMailFormat = true;
```

```
var wpvq_local_caption = 'Acertei %%score%% em 1'; var wpvq_refresh_url = '//endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/plugins/kalins-pdf-creation-station/kalins_pdf_create.php?singlepost=po_5021&&wpvqas=%%wpvqas%%'; var wpvq_share_url = 'https://endoscopiaterapeutica.com.br/quiz/volumosa-lesao-subepitelial-no-fundo-gastrico-qual-a-conduta/'; var wpvq_facebook_caption = 'Acertei %%score%% em 1 , e você?'; var wpvq_facebook_description = '%%details%%'; var wpvq_facebook_picture = null;
```

```
var wpvq_redirection_page = "";
```

